

Baltic Agro

KASVATUSJUHHIS Maasikad



01
2023

MAASIKA KASVATUSJUHIS



Maasikas (Fragaria) vajab kasvuks toitainerikast, niisket, vett hästi läbilaskvat neutraalset mulda ja päikselist kuni poolvarjulist hea õhustusega kasvukohta, mis poleks samas liiga tuuline. Õhk peab puhmikute vahel liikuma, et taimed ei haigestuks näiteks hallitusse, kuid talvine liigne tuul võib puhuda taimedelt lume, tekitades külmakahjustusi. Päikselisemas ja soojemas kohas on saak suurem ja maitavam ning valmib kiiremini.

Maasikas on väga nõudlik mullaviljakuse osas. Kui kasvukohas on väga hea pinnas – saab maasikaid ka ilma väetisteta, kuid vajadusel ja suure saagi saamiseks tuleb lisada orgaanilist või mineraalväetist. Saagi kindlustamiseks tuleb maasikamaad ka umbes 3–4 aasta järel uuendada. Peenra uuendamisel tuleb järgida viljavaheldust, et vältida haigusi ja kahjureid.

Maasikat paljundatakse koduaias peamiselt tütartaimedega, mis kasvavad võsunditele. Tihti kasutatakse peenra rajamiseks nn frigotaimi, mida on säilitatud ületalve külmhoidlas. Frigotaimedega saad saaki juba rajamisaastal.



Tegevused

Sügisel või kevadel – PEENRA RAJAMINE

- Istuta maasikad mais või augusti alguses. Kaeva maapind läbi, korja välja umbrohujuured. Kobestatud mulda sega komposti, kanakakat või maasikaväetist.
 - Tasanda maa ja kujunda peenar. Soovi korral kata peenar maasikakile, peenravaiba või tekstiilmultšiga, et vähendada tulevikus umbrohtude teket, tagada ühtlasem niiskuse režiim ning viljade valmimisel kaitsta vilju hallituse eest.
 - Kasuta kindlasti kontrollitud taimematerjali, et vältida haigusi ja kahjureid!
 - Taimed istuta üksteisest 25 cm kaugusele, ridade vaheks 1 m. Istutamisel jälgi, et lehekodariku keskel olev südamikupung jääks mullast õigele kõrgusele välja.
 - Juurdumise soodustamiseks võid lisada mullale **merevetikaekstrakti** või spetsiaalset **ümberistutusväetist**. Soovi korral multši peenar.
-

Aprill – KASVUPERIOODI ALGUS

- Kata peenar **kattelooriga** (vali sobiva laiusega loor, et tagada piisav ülekate), et kiirendada saagi valmimist.
- Väetamisel kasuta spetsiaalseid väetisi, mille koostisained tugevdavad maasikataimi, soodustavad õitsemist ja parandavad saagi kvaliteeti.
- Kui märkad kahjurite tegevuse jälgi, paigalda liimpüünised ja korralda tõrje. **Sinine püünis** aitab ripslase vastu, **kolmevärviline** on universaalne. Looduslik vahend **NeemAzel** kahjurputukate vastu sobib ka maheaeda. Õielõikajat aitab tõrjuda **Karate Zeon**, pritsimislahusesse lisa kleepuvuse suurendamiseks **rohelist seepi**.
- **Looduslikud taimehooldajad** ja **Neem Vital** spreid tugevdavad taimi.

Mai–juuni – ÕITSEMINE

- Kata peenar õõseks kattelooriga, et vältida õite külmakahjustusi.
- Kastes lisa kord nädalas kastmisvette kaaliumirikast **kastmisväetist**, mis tugevdab taimi ja parandab saagi kvaliteeti.
- Kaitse taimi tigude eest.
- Põua korral kasta kindlasti korralikult, et taimed ei kuivaks ja saak ei kahjustuks.
- Niisked ööd soodustavad hahkhallituse teket. Jälgi taimi ja kasuta taimekaitsevahendit **Switch**. Pritsimislahusesse lisa kleepuvuse suurendamiseks **rohelist seepi**.

Juuni-juuli – VILJADE VALMIMINE

- Kaitse saaki lindude ja tigude eest linnuvõrgu ja **tigude tõrjegraanulitega**.

Juuli-august – PEALE SAAGIKORISTUST

- Peale saagikoristust hakkavad moodustuma järgmise aasta õiepungad. Toeta pungade moodustumist vähese lämmastiksisaldusega **sügisväetisega**.
- Suvel (juulis või augustis) võid vanemal peenral maasikatelt kõik lehed eemaldada (kui septembris, siis eemalda ainult haiged, tugevalt laigulised lehed). Lehed soovitame hävitada, et vähendada haigustekitajad ja areneksid uued terved lehed.
- Tütartaimede võsundid lõika sügisel emapuhmiku küljest lahti, et need seda ei kurnaks.

Järgmisena maasika kasvatamiseks sobivatest:

- **väetistest**
 - **taimekaitsetoodetest**
 - **ja lisatarvikutest.**
-



	PEENRA RAJAMINE	KASVUPERIOODI ALGUS	ÕITSEMIN	VILJADE VALMIMINE	PEALE SAAGIKORISTUST
AEG	SÜGISEL VÕI KEVADEL	APRILL	MAI-JUUNI	JUUNI-JUULI	JUULI-AUGUST
TEGEVUS	Istuta maasikad mais või augusti alguses. Kaeva maapind läbi, korja välja umbrohujuured. Kobestatud mulda sega komposti, kanakakat või maasikaväetist. Tasanda maa. Soovituslik on katta peenar maasikakile, peenravaiba või tekstiilmultsiga, et tagada taimede kiirem juurdumine ning kaitsta vilju hallituse eest. Lõika istikutele kattmaterjali ristküjulistel augud. Taimed istuta üksteisest 25 cm kaugusele, ridade vaheks 1 m. Istutamisel jälgi, et lehekodariku keskel olev südamikupung jääks mullast välja. Juurdumise soodustamiseks võid lisada mullale merevetikaekstrakti või spetsiaalset ümberistutusväetist. Soovi korral multsi peenar.	Kata peenar kattelooriga (min 3,2 m laiune, et tagada piisav ülekate), et kiirendada saagi valmimist. Väetamisel kasuta spetsiaalseid väetisi, mille koostisained tugevdavad õisi ja suurendavad saagi kvaliteeti. Kui märkad kahjurite tegevuse jälgi, paigalda liimpüünised ja korralda tõrje. Sinine püünis aitab ripslase vastu, kolmevärviline on universaalne. Looduslik vahend NeemAzal kahjurputukate vastu sobib ka maheaeda. Õielõikajat aitab tõrjuda Karate Zeon, pritsimislahusesse lisa kleepuvuse suurendamiseks rohelist seepi. Looduslikud taimehoolditajad ja NeemVital sprei tugevdavad taimi.	Kata peenar ööseks kattelooriga, et vältida õite külmakahjustusi. Kastes lisa kord nädalas kastmisväetist, mis tugevdab taimi ja parandab saagi kvaliteeti. Kaitse taimi tigude eest. Põua korral kasta kindlasti korralikult, et õied ei kuivaks.	Kaitse saaki lindude ja tigude eest linnu- või putukavõrgu ja tigude tõrjegraanulitega.	Peale saagikoristust hakkavad moodustuma järgmise aasta õiepungad. Toeta pungade moodustumist vähesel lämmastikusisaldusega sügisväetisega. Niisked ööd soodustavad hahkhallituse teket. Jälgi taimi ja kasuta taimekaitsevahendit Switch. Pritsimislahusesse lisa kleepuvuse suurendamiseks rohelist seepi. Septembris võid vanemal peenral maasikatelt kõik lehed eemaldada (kui oktoobris, siis ainult haiged - tugevalt täpilised lehed) ja hävitada, et häviksid haigustekitajad ja areneks uued terved lehed. Tütartaimede võsundid lõika sügisel emapuhmiku küljest lahti, et need seda ei kurnaks. Kevadel istuta tütartaimed eraldi.
VÄETAMINE	 - Kanakaka - Maasika- ja marjaväetis / 2X hooaja jooksul - Pikatoimeline maasikaväetis / 1X aprillist augustini - Maasikaväetis - Maasika ja marja maheväetis - Lilled, marjade ja köögiviljade vedelväetis / 1X nädalas hooaja jooksul - Ümberistutusväetis Pralumus / 1X pärast istutamist - Merevetikaekstrakt / 1X nädalas				- Sügisene aiaväetis - Sügisene kastmisväetis
AIAAPTEEK	 - NeemAzal - NeemVital spray / 1X-2X nädalas või vastavalt vajadusele - Karate Zeon - Looduslik taimehoolditajad / 1X nädalas hooaja jooksul - Liimpüünised				- Linnuvõrk - Putukavõrk - Switch - Roheline seep
LISATARVIKUD	- Maasikakile - Peenravaip - Tekstiilmults - Kinnitusklambrid - Kinnitusklambrid - Taimeetiketid - PVC-kaared - Kattelooriga				- Kattelooriga - Putukavõrk

Väetamine

Maasikas

VÄETAMINE

- graanulväetised
- vedel- ja kastmisväetised
- maheväetised



Väeta õigesti! Maasikas vajab eri arengufaasides erinevaid elemente: kasvu alguses puhmiku kasvatamiseks, viljade paisumiseks, aga ka sügisel õiealgmete tekkeks lämmastikku, puhmiku kasvatamisel magneesiumi, õitsemise ajal tsinki ja boori, viljumise ajal palju kaaliumi. Fosfor aitab kaasa taime juurdumisele ja kiirendab viljade valmimist. Kaltsiumi on vaja igas kasvufaasis.

	PEENRA RAJAMINE	KASVUPERIOODI ALGUS	ÕITSEMIN	VILJADE VALMIMINE	PEALE SAAGIKORISTUST
AEG	SÜGISEL VÕI KEVADEL	APRILL	MAI-JUUNI	JUUNI-JUULI	JUULI-AUGUST
VÄETAMINE	Kanakaka				Sügisene aiaväetis
	Maasika- ja marjaväetis / 2X hooaja jooksul				Sügisene kastmisväetis
	Pikatoimeline maasikaväetis / 1X aprillist augustini				
	Maasikaväetis				
	Maasika ja marja maheväetis				
	Lilled, marjade ja köögiviljade vedelväetis / 1X nädalas hooaja jooksul				
	Ümberistutusväetis Pralumus 1X pärast istutamist				
	Merevetikaeakstrakt / 1X nädalas				
		Maasika kastmisväetis			

Peenra rajamine

- Kanakaka
- Maasika- ja marjaväetis
- Pikatoimeline maasikaväetis
- Maasikaväetis
- Maasika ja marja maheväetis
- Lilled, marjade ja köögiviljade vedelväetis
- Ümberistutusväetis Pralumus
- Merevetikaeakstrakt

Kasvuperioodi algus

- Kanakaka
- Maasika- ja marjaväetis
- Pikatoimeline maasikaväetis
- Maasikaväetis
- Maasika ja marja maheväetis
- Lilled, marjade ja köögiviljade vedelväetis
- Ümberistutusväetis
- Merevetikaeakstrakt
- Maasika kastmisväetis

Õitsemine

- Pikatoimeline maasikaväetis
- Lillede, marjade ja köögiviljade vedelväetis
- Maasika kastmisväetis

Viljade valmimine

- Pikatoimeline maasikaväetis
 - Lillede, marjade ja köögiviljade vedelväetis
-

Peale saagikoristust

- Sügisene aiaväetis
- Sügisene kastmisväetis
- Pikatoimeline maasikaväetis
- Lillede, marjade ja köögiviljade vedelväetis

Graanulvæetised



- Væetis laotada ümber taime, segada mulda ja seejärel taimi kasta.

Kanakaka

1,5 l – 10 m²



Maasika- ja marjavæetis

Istutamisel: 50 g/m². Kasvuaegselt: 8-10 g (1 tl) taime kohta.



Maasikavæetis

Istutamisel: 50 g/m². Kasvuaegselt: 8-10 g (1 tl) taime kohta.



Pikatoimeline maasikavæetis

Væeta 1 kord aastas aprillist juulini kulunormiga 50g/m²



Sûgisene aiavæetis

Sûgisvæetist kasutatakse juulist oktoobrini. 1 kuhjaga spl vastab u 20 grammile. Maasikas pärast saagikoristust 4 kg/100 m².



Vedel- ja kastmisväetised



- Valmistada veega segades kastmislahus ja kasta lahusega taimi.

Lillede, marjade ja köögiviljade vedelväetis

Sobib maasikakasvatuseks rõdul ja terrassil. 1 l – 250 l kastmislahuse tegemiseks. Väetislahusega kasta taimi vegetatsiooniperioodil (märtsist septembrini) 1 kord nädalas.



Maasika kastmisväetis

Lahustage pulber vees ja kastke taimi 1 kuhjaga mõõdulusikatäis * 1 l veele valmistatud lahusega üks kord nädalas või 1 kuhjaga mõõdulusikatäis 10 l veele igakordsel kastmisel. Väetist kasutatakse kevadel ja suvel täiendväetamiseks.



Sügisene kastmisväetis

Lahustage 2 kuhjaga mõõdulusikatäit väetist 5 l vees. Kastke taimi üle nädala. Soovitav kasutada augusti algusest septembri lõpuni. 300 g – 375 l.



Ümberistutusväetis Pralumus

Ühe pakendi sisu – 24 rõdutaimele või 12 aiataimele. 50 g – 10 l.





Maheaeda

Merevetika ekstrakt

30 ml/1 l vee kohta iga 7 päeva tagant.



Maasika mahevätis

Maasikataimede istutamisel 80 g/m² ehk 2-3 peotäit ≈ 13 taime. 1 peotäis – 30 g.



Maasikate aiaapteek

Maasikataimede kaitse

MAASIKATE KAHJUSTAJAD



1. **Maasika-õielõikaja** – õievarred on pooleldi läbi näritud, õienupp on murdunud, õis ei puhke ja nupp kuivab.
2. **Rohulutikas** – vilja kuju moondub, nn kassinäoga marjad.
3. **Kedriklest** – taimed on rääbakad, marjad tõmbuvad pruunikaks ja on pragulise pinnaga, osa vilju kuivab.
4. **Maasikalest** – lehed kahvatud ja krimpsus, hävinevad enne väljaarenemist.
5. **Ripslane** – vili on pruun ja kuivanud, lehed keerduvad, võrsed väänduvad, lehe alumine pind helgib hõbedaselt.
6. **Hahkhallitus** – hallitavad marjad, aga ka õienupud, õied ja lehed.



Maasika hahkhallitus (*Botryotinia fuckeliana*) tunnuseks on hallikaspruunid vesised mädanikulaigud maasikataimede lehevartel, õielehtedel, vartel, nuppudel ja viljadel. Haiguse süvenedes laskuvad õisikud longu, mädanevad ja kattuvad kergestilenduva hallituskirmega. Väga ebasoodsates kasvutingimustes haigestuvad ka varred ja vanemad lehed, mis samuti pruunistuvad, pehmenevad ja mädanevad. Haigus kimbutab ka juurdunud pistikuid.

Põhjus

Seen säilib väikeste mustade seenemügaratena taimejäänustes. Seene spoorid levivad tuule ja vihmaga ning sisenevad taime putuka ja muude kahjustuste lõhede kaudu, õite kaudu või levivad kõdunevast taimest. Haigestumist soodustavad suur õhuniiskus ja samaaegne madal õhutemperatuur, vähene valgus ja seisev õhk, ühekülgne lämmastikuga väetamine ning taimede tihe seis ja mulla liigne happelisus.

Lahendus

Hahkhallituse ja antraknoosi vastu aitab **Switch 62,5 WG**-ga pritsimine nii enne kui pärast õitsemist ja ka enne koristust.



- Kulunorm – 1,0 kg/ha
- Vee kogus – 300–500 l/ha
- Pritsimiste arv – 3
- Intervall – 10 päeva
- Ooteaeg – 1–3 päeva



Allikas: <https://agrobasesapp.com/estonia/disease/hahkhallitus>



Allikas: <https://agrobasesapp.com/estonia/disease/hahkhallitus>

Biofungitsiid Prestop maasikale

Biofungitsiid annavad võimaluse maasikahaiguste tõrjeks looduslike preparaatidega. Biofungitsiidide toimemehhanism põhineb ökoloogilisel tasakaalul: taimedele kasulikud mikroorganismid, eosed ja seenniidistik jõuavad haarata eluruumi enne, kui kahjulikud organismid kohale jõuavad. Hävitamise asemel luuakse ökoloogiline tasakaal.

Maasikate seenhaiguste tõrjeks sobib profiaiaanduses kasutatav pritsimisvahend **Prestop**. Toote kohta saab uurida **aianduse nõuandetelefonilt 5683 3005**.

	PEENRA RAJAMINE	KASVUPERIOODI ALGUS	ÕITSEMIN	VILJADE VALMIMINE	PEALE SAAGIKORISTUST
AEG	SÜGISEL VÕI KEVADEL	APRILL	MAI-JUUNI	JUUNI-JUULI	JUULI-AUGUST
AIAAPTEEK 		NeemAzaal NeemVital spray / 1-2X nädalas või vastavalt vajadusele Karate Zeon Looduslik taimetehoolitajad / 1X nädalas hooaja jooksul Liimpuunised	Looduslik tigu tõrjepulber Nakkjate puunised	Linnuvõrk Putukavõrk	Switch Roheline seep

Kasvuperioodi algus

- NeemAzal
- NeemVital Spray
- Karate Zeon
- Looduslikud taimehoolitsejad
- Liimpüünised

Õitsemine

- Looduslik tiguide tõrjepulber
- NeemVital spray
- Nälkjate püünised
- Looduslikud taimehoolitsejad

Viljade valmimine

- Linnuvõrk
- Putukavõrk

Peale saagikoristust

- Switch
- Roheline seep



Seireks, ennetuseks ja maheaeda

NeemAzal

3 ml segatuna 1 l veega 10 m² kahjurite vastu pritsimiseks.



Tiguide looduslik tõrjepulber

Pulbrit raputada tiguide eest kaitstava ala ümber, moodustades tiguide teele takistusriba. Takistusribasid tuleb tõrje alustamisel korduvalt uuendada, samuti korrata tõrjet pärast vihma.



Linnuvõrk

Et linnud ei pääseks läbi võrgu pealtpoolt marju nokkima, asetada võrgud marjapöösastest–puhmastest veidi kõrgemale, tokkidele või spetsiaalsele raamile. Võrkude alumine serv peaks jääma nii, et linnud ei pääseks võrgu alla.



Liimpüünised

Sinine värv meelitab ligi ripslased. Seiramiseks: 1 leht 250–1000 m² kohta. Kahjurite tõrjumiseks: 1 leht 2–3 m² kohta.



Looduslik taimehoolditseja I

Taimede ennetav ja korduv piserdamine on soovitatav 7–10 päevaste intervallidega. Pritsige ka lehtede alumisele küljele. Kõige parem on toodet kasutada hommikul või õhtul. Hoiduda pritsimast keskpäeval, sest päike võib lehtedel olevate vedelikutilkade koosmõjul tekitada lehtedele põletust.



Tigude ja nälkjate püünis

Kaevata maasse nii, et avatud serv jääks pisut maapinnast kõrgemale, et mitte püüda kasulikke kahjurite hävitajaid. Püüdisesse kallata õlut või pärm ja piima segu.



NeemVital

Spreid võib kasutada kogu kasvuaja vältel. Pihustada taime lehtedele 1-2 korda nädalas või vastavalt vajadusele.

Võimalusel ära pritsi õitele ega õienuppudele. Kaitske pihustatud lehti otsese päikesevalguse eest (veepiiskade „põletava klaasi efekt“).



Looduslik taimehoolditseja F

Taimede ennetav ja korduv piserdamine on soovitatav 7-10 päevaste intervallidega. Ärge unustage pritsida ka lehtede alumisele küljele. Kõige parem on toodet kasutada hommikul või õhtul. Kindlasti tuleks hoiduda pritsimast keskpäeval, sest päike võib lehtedel olevate vedelikutilkade koosmõjul tekitada lehtedele põletust.



Putukavõrk

Sobib kasutamiseks katteloori alternatiivina. Vajalik on õitsemise ajal putukavõrk eemaldada tolmeldajate juurdepääsemiseks. Putuka võrk loob taimedele soodsa kasvukliima.





Taimekaitsevahendid



Taimekaitsevahendi kasutamisel tuleb järgida pakendil ja ohutuskaardil olevat kasutusjuhendit. Taimekaitsetööde tegemisel kanda sobivaid isikukaitsevahendeid ning järgida hügieeni- ja ohutusnõudeid.

Karate Zeon

Õielõikaja ja ripslase tõrjeks. 1–3 ml
2–4 l vees 100 m²–le.



Roheline seep

Kahjurputukate peletamine ja
taimekaitsevahendite pritsilahuste
kleepuvuste suurendamine. 100–500
ml kontsentrati lahustada 10 l vees.



Switch

Seenhaiguste tõrjeks
Pritsimislahus: 5 g preparaati
lahustada 2,5 l vees.



Lisatarvikud

	PEENRA RAJAMINE	KASVUPERIOODI ALGUS	ÕITSEMIN	VILJADE VALMIMINE	PEALE SAAGIKORISTUST
AEG	SÜGISEL VÕI KEVADEL	APRILL	MAI-JUUNI	JUUNI-JUULI	JUULI-AUGUST
LISATARVIKUD	Maasikakile, Peenravaip, Tekstiilmultš, Kinnitusklambrid, Taimeetiketid	Katteloor, PVC-kaared	Katteloor, Putukavõrk		

Peenra rajamine

- Maasikakile
- Peenravaip
- Kinnitusklambrid
- Taimeetiketid
- Tekstiilmultš

Kasvuperioodi algus

- PVC-kaared
- Kinnitusklambrid
- Katteloor

Õitsemine

- Katteloor
- Putukavõrk


Maasikas kardab kevadist öökülma.



- Kül mavõetud õied on seest mustad ja mari neist ei arene. Kaitse peenart öösiti (vajadusel kahekordse) kattelooriga.

Kinnitusklambrid

Lükka klamber läbi tekstiili/kile ja suru tugevasti pinnasesse.



Kinnituspiigid

Plastikust kinnituspiigid on mõeldud katteloori kinnitamiseks.



Peenravaip

Peenravaip laotatakse ettevalmistatud pinnasele, servad kinnitatakse ning terava noa abil lõigatakse X-kujulised istutus- või külviaugud. Peenravaip kannatab tallamist ja peab vähemalt 5 aastat vastu, kui seal peal käia.



Katteloor

Laota otse taimedele, kinnita äärtest mulla või nt armatuurlattidega. Arvesta suuruse valikul kinnitamiseks vajaliku osaga!



Maasikakile

Kile on soovitatav paigaldada taimede istutamise ajal. Samuti on kindlasti vaja kasutada tilkkastmissüsteemi, kui kile on ilma aukudeta, sest vihmavesi ei imbu läbi kile maasikataime juurteni.



Taimeetiketid



PVC kaared

Painduvad PVC kaared sobivad peenrale taimede kaitsmiseks katteloori, kasvuhoonekile või putukavõrguga.



Aiaprits

Taimekaitsevahendi kasutamisel tuleb järgida pakendil ja ohutuskaardil olevat kasutusjuhendit. Taimekaitsetööde tegemisel kanda sobivaid isikukaitsevahendeid ning järgida hügieeni- ja ohutusnõudeid.



Putukavõrk

Loo maasikatele hea kasvukliima putukavõrgu abil. Enne õitsemist eemalda kate tolmeldajate juurdepääsuks.





Tekstiilmultš

Tekstiilmultš tuleks vahetada välja iga 2 aasta tagant, sest materjalile tekib kanga peal käies ja vee tagajärjel samblik.



KATTELOORIL ON
VAJALIK ÜLEKATE




PEENRAVAIBA
KASUTAMINE

Tegevusjärjekord

1 2 3

ÜHEREALINE PEENAR



KAHE- VÕI KOLMEREALINE PEENAR

80 cm



Peenra kõrgus 15 cm

80 cm



Peenra kõrgus 15 cm

BALTIC AGRO KASVATUSJUHISED

Kasvatusjuhiste abil saab koduaias kasvatada lihtsalt ja õigesti terveid, lopsakaid ja saagikaid taimi. Baltic Agro kasvatusjuhised aitavad leida vaevata taimekasvatust infot taimede kasvatamiseks ning võita aega aiaelu nautimiseks.

Kasvatusjuhistes tutvustame kasvatamise kunsti saladusi: näiteks kuidas ja millal kasta või anda taimedele väetist, arvestada erinevate taimede vajadustega ja jälgida oma hoolealuste tervist. Siin on ka soovitusel parimatele seemnetele, väetistele, taimede kaitsevahenditele ja muule aias vajalikule.

Baltic Agro - Sinuga aias!

Maasika kasvatusjuhise veebis

Järgmisena on valmimas
porgandi kasvatamise juhised!



Kirjuta meile, kas kasvatusjuhistest oli sulle abi! Anna teada, missuguste taimede kasvatamise ja kasvatustappide kohta vajad põhjalikumaid infot.

Tagasiside on oodatud
balticagro.koduaed@balticagroestonia.com.



Leia nippe ja nõuandeid, osale mängudes ja loosimistel!
facebook.com/balticagrokoduaed



koduaed.balticagro.ee

Baltic Agro